

“APLICACIÓN URBANA”

LUCANIL 25 C.E.

fipronil

Concentrado Emulsionable

Insecticida Fenilpirazol

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazole-3-carbonitrilo (Equivalente a 26.12 g de i.a./L a 20°C).	2.87
INGREDIENTES INERTES:	
Solventes y emulsificantes.	97.13
	<hr/>
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-URB-INAC-0101A-X0027-009-2.87



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUCIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

LUCANIL 25 CE es un insecticida de efecto residual indicado para aplicarse sobre grietas, hendiduras donde las plagas habitan comúnmente, también pueden aplicarse debajo de muebles, detrás de fregaderos, armarios, plomería, gabinetes u otras áreas donde puedan esconderse las plagas. Utilice **LUCANIL 25 CE** para el control de las siguientes plagas:

Nombre común	Nombre científico	Dosis
Termitas: Subterráneas De la madera seca De nidos acartonados	<i>Reticulitermes spp</i> <i>Zootermopsis spp</i> <i>Heterotermes spp</i> <i>Coptotermes spp</i> <i>Marginitermes hubbardi</i> <i>Cryptotermes spp</i> <i>Kaloterms sp</i> <i>Nasutitermes spp</i>	2 L en 100 L para infestaciones normales 4 L en 100 L para infestaciones severas
Cucarachas: Germánica De bandas cafés Café Oriental Americana	<i>Blatella germánica</i> <i>Supella supellectilium</i> <i>Periplaneta fuliginosa</i> <i>Blatta orientalis</i> <i>Periplaneta americana</i>	60 mL en 10 L de agua
Hormigas: Cosechadora De fuego Argentina Faraona De cabeza grande Del pavimento Pequeña hormiga el fuego Domestica Carpintera	<i>Pogonomyrmex sp</i> <i>Solenopsis sp</i> <i>Iridomyrmex humilis</i> <i>Monomorium pharaonic</i> <i>Pheidole megacephala</i> <i>Tetramorium sp</i> <i>Wasmannia auropunctata</i> <i>Tapinoma spp</i> <i>Camponotus spp</i>	
Otras plagas: Moscas Mosquitos Avispas o véspidos	<i>Musca domestica</i> <i>Fannia spp</i> <i>Drosophila spp</i> <i>Culex spp</i> <i>Aedes spp</i> <i>Anopheles spp</i> <i>Vespula spp</i> <i>Vespa spp</i> <i>Xenopsylla spp</i>	10 mL/L de agua para infestaciones normales 20 mL/L de agua para infestaciones severas

Pulgas	<i>Ctenocephalides spp</i>	En aplicaciones totales: 1 L de mezcla es para 15 a 20 m ²
Chinches	<i>Triatoma spp</i>	
Chinche de la cama	<i>Rhodnius proxilus</i>	
Pescadito de plata	<i>Cimex vspp</i>	
Grillo	<i>Lepisma spp</i>	
Cochinillas	<i>Acheta domesticus</i>	
Tijerilla	<i>Isopoda</i>	
Alacranes	<i>Forficula auricularia</i>	
Arañas	<i>Centruroides spp</i>	
Ciempiés	<i>Latrodectus mactans</i>	
Gorgojos	<i>Loxosceles spp</i>	
Garrapatas	<i>Quilópodos y diplopodos</i>	
	<i>Tribolium castaneum</i>	
	<i>Sitophilus oryzae</i>	
	<i>Trogoderma granarium</i>	
	<i>Tenebroides spp</i>	
	<i>Ixodidae</i>	

“FRECUENCIA DE APLICACIÓN”: Aplicarse a un intervalo de 3 a 4 semanas entre aplicaciones.

“TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS”: 2 horas o inmediatamente después de que el tratamiento haya secado.

“METODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO”: Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, abra el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área tratar. Para aplicarse, el producto debe ser diluido en agua limpia. Vierta el agua en un recipiente de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o plástico, agregue la cantidad recomendada de **LUCANIL 25 CE**, medida con ayuda de una probeta y agite utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente. Vierta la mezcla en el tanque del equipo de aplicación o aspersor. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

“CONTRAINDICACIONES”: No aplique **LUCANIL 25 CE**, durante la preparación de alimentos o manipulación de forrajes. Las aplicaciones deben realizarse únicamente en exteriores de las instalaciones.

“INCOMPATIBILIDAD”: **LUCANIL 25 CE**, debe aplicarse solo, no se recomienda su uso en mezcla con otros plaguicidas.



PRECAUCIÓN

