

“APLICACIÓN URBANA”

PULVERIZADOR

5% PH

deltametrina



Polvo Humectable

Insecticida Piretroide

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Deltametrina: (S)- α -ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 50 g de i.a./kg).	5.00
INGREDIENTES INERTES:	
Humectante, dispersante y diluyente	95.00
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-URB-INAC-101J-X0009-002-005



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel
Nocivo si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUCIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”

**“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

PULVERIZADOR 5% PH es un insecticida-acaricida piretroide que actúa por contacto e ingestión indicado para el control de insectos voladores y rastreros, formulado como polvo humectable, para ser aplicado en superficies y en el suelo mediante pulverización de gota. Su aplicación debe ser efectuada por profesionales en el control de plagas urbanas.

PULVERIZADOR 5% PH puede ser aplicado con cualquier equipo convencional. Para cubrir áreas grandes y sitios elevados utilice moto-aspersora.

Uso	Plaga		Dosis g/L de agua	Modo de aplicación
	Nombre común	Nombre científico		
Casas Cabañas Edificios Hoteles Restaurantes Plantas industriales Mercados	Moscas	<i>Musca domestica</i> <i>Stomoxys calcitrans</i> <i>Fannia spp</i>	5	1 L de mezcla para 33 m ²
Industria de los alimentos* Plantas industriales Mercados	Mosquitos	<i>Culex spp</i> <i>Aedes spp</i> <i>Anopheles spp</i>	5	1 L de mezcla rinde 25 m ² (10 L para 250 m ²)
Hospitales Clinicas	Hormigas: Negra Faraona De fuego	<i>Monomorium minimum</i> <i>Monomorium pharaonis</i> <i>Solenopsis invicta</i> <i>Lasius niger</i>	5	Aplicación residual en banda.
Centros de Salud	Chinchas	<i>Cimex lectularius</i>	5	Aplicación generalizada en superficies porosas y lisas, en techos, paredes y pisos.
Oficinas	Triatominos	<i>Rhodnius prolixus</i> <i>Triatoma pallidipennis</i>	5	
Almacenes	Flebotomos	<i>Lutzomyia spp</i>	5	Aplicación focalizada.
Transportes	Cucarachas: Americana	<i>Periplaneta americana</i>	10	
Cines	Oriental	<i>Blatta orientalis</i>		
Teatros	Germanica	<i>Blattella germanica</i>		
Escuelas	Arañas	<i>Latrodectus spp</i>	10-20	
Cuarteles	Alacranes	<i>Centruroides spp</i>	10-20	

Frecuencia de aplicación: Se recomienda aplicar al 2do o 3er mes posterior a la aplicación inicial o dependiendo de la presencia de la plaga.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Se recomienda esperar 30 minutos posteriores a la aplicación para poder tener acceso a los sitios tratados.

“MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

PULVERIZADOR 5% PH debe ser aplicado en dilución con agua. Utilice el equipo de protección personal mencionado en la sección de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO” y abra el envase utilizando un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), rasgando cuidadosamente donde indica la línea punteada para evitar la formación de nubes de polvo.

Preparación de la solución de aplicación: Pese con ayuda de una báscula la cantidad recomendada de **PULVERIZADOR 5% PH** para la plaga a controlar y vierta de manera directa en un recipiente aparte agregando un poco de agua para realizar una premezcla; en el tanque de aplicación vacíe agua hasta la mitad del total de agua que se utilizara en la elaboración de la mezcla, vacíe la premezcla en el tanque de aplicación y añada la cantidad de agua restante, cierre el taque y agite enérgicamente hasta que la mezcla se vea homogénea. Aplique el producto. Vuelva agitar el tanque antes de volver a usarlo si se interrumpe momentáneamente el tratamiento.

“CONTRAINDICACIONES”

No se recomienda aplicar el producto cuando exista mucho viento, ni en horas de calor intenso. No aplique este producto en áreas cerradas mientras se encuentren ocupadas por personas o animales. El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto. No se recomienda que este producto sea mezclado con otros productos.



PRECAUCIÓN

