

"APLICACIÓN URBANA"

PUNCHMETRINA

82 SC

bifentrina

Suspensión Concentrada
Insecticida Piretroide

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: Bifentrina: 2-metil-3-fenilbencil (1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato. Equivalente a 82 g/L a 20 °C.	7.52
INGREDIENTES INERTES: Diluyentes, Surfactante, Dispersante, Antiespumante, Conservador, Espesante y Estabilizante.	92.48
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-URB-INAC-0176-X0043-064-7.52



Nocivo en caso de ingestión



"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUCIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

**“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”**

BIFENTRINA 82 SC / PUNCHMETRINA 82 SC es un insecticida-acaricida, perteneciente a la familia de los piretroides, actúa por contacto e ingestión, recomendado para ser aplicado en zonas urbanas, hoteles, restaurantes, supermercados, bodegas, sótanos, casas habitación, escuelas, oficinas y edificios, uso en predios baldíos y vías de ferrocarril, en general para el control de plagas como Mosquitos, Moscas, Chinchas, Cucarachas, Hormigas y Pulgas.

Aplicar el producto de acuerdo a las indicaciones del siguiente cuadro:

Plaga	Dosis	Aplicación
Mosquito: <i>Aedes aegypti</i> , <i>Anopheles sp</i> , <i>Culex spp.</i>	Tratamiento residual: Diluir 10 a 20 mL en 1 L de agua.	Aplicar de manera uniforme sobre las superficies donde se posan los moscos y las moscas, como paredes, muros, techos y pisos; sin llegar al escurrimiento.
Mosca doméstica: <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia canicularis</i> .		
Mosca de los establos: <i>Muscina stabulans</i>		
Mosca de la fruta: <i>Drosophila melanogaster</i>		
Cucarachas Alemana: <i>Blattella germanica</i> Oriental: <i>Blatta orientalis</i> Americana: <i>Periplaneta americana</i> De banda café: <i>Supella longipalpa</i>	Diluir 10-15 mL en 1L de agua	Aplicar en lugares donde transitan o se refugian las cucarachas frecuentemente como grietas y hendiduras, coladeras, y lugares húmedos. Utilizar dosis de 20 mL cuando la infestación sea alta y la dosis de 10 mL para mantenimiento.
Hormigas: <i>Monomorium spp.</i> , <i>Solenopsis spp.</i>		Aplicar de manera uniforme en zonas por donde transita la plaga; sin llegar al escurrimiento.
Pulgas: <i>Ctenocephalides felis</i> , <i>Xenopsylla cheopsis</i>		Aplicar en áreas destinadas a las mascotas.
Chinche común: <i>Cimex lectularius</i> , Cienpies: <i>Myriapoda sp.</i> Grillos: <i>Acheta domestica</i> Tijerilla: <i>Forticula auricularia</i> Pescadito de plata: <i>Lepisema saccharina</i> Avispa: <i>Vespula sp.</i>		Aplicar de forma perimetral en los lugares a tratar, por ejemplo, en los marcos de puertas, ventanas y accesos, de manera que se forme una barrera de protección contra la plaga.
Alacrán: <i>Centuroides spp.</i>	Aplicar en lugares donde frecuentemente transitan o se refugian los alacranes, como grietas y hendiduras, coladeras, y lugares húmedos.	

Frecuencia de aplicación: La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de las plagas, por lo que si es necesario, se deberá realizar una aplicación adicional a un intervalo de 30 días, o cuando se observen nuevas poblaciones. Por tal razón, se deberán de realizar monitoreos continuos.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Durante el tratamiento deberán permanecer cerradas puertas y ventanas por una hora, posteriormente se debe ventilar el área por 30 minutos. Después de esto, podrá entrar a las áreas tratadas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Preparación

Siempre que vaya a manipular o aplicar el producto, utilice el equipo de protección adecuado, que incluya; Overol impermeable con capucha, guantes y botas de goma de neopreno, mascarilla con filtros para vapores, y careta protectora.

Realice el cálculo de la cantidad de producto y de agua de dilución a utilizar.

Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción), esto se puede realizar con la pestaña de la tapa, colocándola sobre el sello de inducción con la parte lisa que tiene una pequeña pestaña en la orilla, girar y retirar después de haber roto dicho sello.

Calibre el equipo de aplicación. Vacíe al tanque del equipo de aplicación, la mitad de la cantidad total de producto a utilizar, añada la mitad de la cantidad total de agua a utilizar, agregue la cantidad de producto restante, y finalmente el volumen sobrante de agua a emplear. Asegúrese de cerrar correctamente el tanque y agite hasta conseguir una mezcla completamente homogénea.

Aplicación

Con un litro de solución pueden llevarse a cabo aplicaciones de 30 a 40 m² sin embargo el área puede variar dependiendo del equipo de aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar el producto en áreas cerradas mientras estas se encuentran ocupadas por personas o animales. En el lugar en el que se va a realizar el tratamiento, no deben almacenarse alimentos, ropa o forrajes. Respete el tiempo de reentrada a las zonas tratadas.

En aplicaciones al exterior, no aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/h, ni cuando la temperatura sea mayor a 30 °C, o cuando exista probabilidad de lluvia.



PRECAUCIÓN

