

"APLICACIÓN URBANA"

SINISTER^{25 CE}

cipermetrina

Concentrado Emulsionable
Insecticida piretroide

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Cipermetrina: (RS)- α -ciano-3-fenoxibencil(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	25.51
INGREDIENTES INERTES:	
Emulsificantes y solvente	74.49
Total	100.00

No. de Registro: RSCO-URB-INAC-0111-X0084-009-25.51



Nocivo en caso de ingestión



"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD"



PRECAUCIÓN



INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

SINISTER 25 C.E. es un insecticida piretroide que puede ser utilizado en interiores y exteriores.

Nombre común	Nombre científico	Dosis	Recomendaciones	Observaciones
Piojo de la cabeza	<i>Pediculus humanus capitis</i>	4 mL/L de agua	Asperjar techos, paredes y pisos, sin llegar al escurrimiento. Para chinches, piojos y pulgas, aplicar en áreas de descanso de animales domésticos.	Se recomienda para el control de las plagas aquí indicadas en los interiores y exteriores de casas, oficinas, hoteles, restaurantes, mercados, hospitales, laboratorios, centros de salud, transportes, cines, teatros, escuelas, industria, industria alimentaria, industria farmacéutica, bodegas y almacenes (materia prima y producto terminado).
Piojo del cuerpo	<i>Pediculus humanus corporis</i>			
Chinche de las camas	<i>Cimex lectularius</i>			
Chinche picuda	<i>Triatoma infestans</i>			
Pulga del gato	<i>Ctenocephalides felis</i>			
Hormiga Faraón	<i>Monomorium pharaonis</i>			
Hormiga de fuego	<i>Solenopsis xyloni</i>			
Avispa	<i>Vespula acádica</i> <i>Vespula alascensis</i> <i>Vespula inexpectata</i> <i>Vespula koreensis</i> <i>Vespula maculifrons</i> <i>Vespula rufa</i> <i>Vespula squamosa</i>		Asperjar techos, paredes y pisos, sin llegar al escurrimiento. Con equipo micronizador, distribuir uniformemente la nebulización, asegurándose que el lugar permanezca cerrado durante 30 minutos después de la aplicación.	
	Mosquito de la fiebre amarilla			
Mosquito Anopheles	<i>Anopheles albimanus</i> <i>Anopheles darlingi</i> <i>Anopheles neivai</i> <i>Anopheles pseudopunctipennis</i> <i>Anopheles aztecus</i>			
	Mosquito común			
Mosca doméstica o común	<i>Musca domestica</i>			
Mosca de los establos	<i>Stomoxys calcitrans</i>			
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>	4-8 mL/L de agua	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde frecuenta la plaga. Dirigir la aplicación en grietas o hendiduras. Con equipo micronizador, distribuir uniformemente la nebulización, asegurándose que el lugar permanezca cerrado durante 30 minutos después de la aplicación. Utilizar dosis altas en infestaciones altas.	
Cucaracha oriental	<i>Blatta orientalis</i>			
Cucaracha alemana	<i>Blatella germanica</i>			
Alacrán	<i>Centruroides elegans elegans</i> <i>Centruroides infamatus</i> <i>Centruroides limpidus</i> <i>Centruroides meisei</i> <i>Centruroides margaritatus</i> <i>Centruroides nigrescens</i> <i>Centruroides noxius</i> <i>Centruroides suffusus</i>			

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Va a estar determinada por la reincidencia de las plagas, por lo que, si es necesario, se deberá aplicar a un intervalo de 30 días o cuando se observen nuevas poblaciones. Por tal razón, se deberán de realizar monitoreos continuos.

TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS: Debe asegurarse que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación durante dos horas. Transcurrido este tiempo, ventilar el área por 30 minutos y se podrá ingresar a las áreas tratadas.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, use correctamente el equipo de protección personal (overol impermeable con capucha integrada, mascarilla equipada con cartuchos para vapores, goggles o lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno), abra el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora y en un recipiente aparte preparar la premezcla de la dosis recomendada a utilizar en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la premezcla de **SINISTER 25 C.E.** al tanque de aspersión y agregar el agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla.

Con un litro de la mezcla se asperja aproximadamente un área de 30-40 m². No obstante, esto puede variar de acuerdo al equipo de aplicación y boquilla que se utilice.

CONTRAINDICACIONES: Aplicar **SINISTER 25 C.E.** solo, no se recomienda mezclar con otros plaguicidas.

No asperjar el producto en áreas sucias o cubiertas por polvos y/o grasas, ya que puede afectar la efectividad del producto. Cuando se aplique en los exteriores, no hacerlo cuando haya vientos con velocidades mayores a 10 km/hora o en presencia de lluvia. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte o cuando se observe que éste sea capaz de arrastrar las gotas del producto o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

INCOMPATIBILIDAD: **SINISTER 25 C.E.** debe aplicarse solo, no se recomienda su uso en mezcla con otros plaguicidas.

