

"USO EXCLUSIVO DE JARDINERÍA"

TYGOS

bifentrina

Granulado

Insecticida / Piretroide

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	0.30
Bifentrina: 2-metil-3-fenilbencil (1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 3 g de i.a./kg)	
INGREDIENTES INERTES:	99.70
Sinergista, Cosolvente, Secante, Adherente, Vehículo y Colorante	
Total:	100.00

No. de Registro: RSCO-INAC-0176-X0807-005-0.30

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"



PRECAUCIÓN



“INSTRUCCIONES DE USO”
“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

TYGOS es un insecticida éster piretroide granulado de aplicación al suelo que actúa por contacto e ingestión. Se recomienda para su aplicación en Jardines, Campos de golf, Canchas de fútbol, Áreas verdes, Patios, Solares, Pastos, Céspedes, áreas de esparcimiento, Macetas y Áreas de plantas ornamentales, de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

Plaga	Dosis (g/10 m ²)	Frecuencia de aplicación	Intervalo entre cada aplicación
Nombre común (<i>nombre científico</i>)			
Hormiga Cabezona (<i>Pheidole megacephala</i>) Hormiga de Fuego (<i>Solenopsis</i>) Hormiga arriera (<i>Atta cephalotes</i>) Hormiga Cortadoras de hojas (<i>Atta colombica</i>) Grillo Doméstico (<i>Acheta domesticus</i>) Grillo Campestre (<i>Gryllus campestris</i>) Araña violinista (<i>Loxosceles laeta</i>) Alacrán o escorpion (<i>Chactas Keyserlingi</i>) Viuda Negra (<i>Latrodectus mactans</i>) Cienpiés (<i>Chilopoda</i>) Gallina ciega (<i>Phyllophaga sp</i>) Gusano de alambre (<i>Agriotes spp</i>) Diabrotica (<i>Diabrotica sp.</i>) Tijerilla (<i>Forficula auricularia</i>)	200-250	2 aplicaciones	Intervalo de 30 días entre cada aplicación. Sin embargo, las condiciones de humedad (riegos frecuentes), temperaturas elevadas y una intensa actividad de plagas pueden modificar el tiempo de aplicación, por lo que se recomienda monitorear y vigilar la actividad de los insectos con el objetivo y hacer re-aplicaciones si son necesarias. Para mejores resultados aplicar los productos por la noche o temprana hora del día.

TIEMPO DE REENTRADA: Ingresar a las zonas tratadas después de 12 horas de la aplicación. No obstante, si el riego es requerido y en el lapso de 12 horas aún no está seca el área tratada. Permitir la entrada hasta después que esté completamente seca el área tratada.

“MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO”

Se debe utilizar el equipo de protección personal adecuado y completo (sombrero, overol de algodón o camisa de manga larga y pantalón largo de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos o con cartucho respiratorio, lentes de seguridad con protección hermética lateral, guantes y botas de neopreno).

TYGOS viene listo para su uso. Abra el saco y agregue en el equipo de aplicación (tolva o depósito) la dosis autorizada. Posteriormente, proceder a realizar la aplicación. Se recomienda utilizar equipos manuales o mecánicos para la aplicación de gránulos. Para obtener aplicaciones uniformes, siempre calibre su equipo de aplicación.

Aplicar cuando el suelo esté húmedo. **TYGOS** no debe ser aplicado en mezcla con ningún otro producto.

CONTRAINDICACIONES

Se sugiere no aplicar cuando el suelo esté seco. En caso de hacerlo, se deberá realizar un riego de manera inmediata para activar el producto. No alimentar o pastoree ganado en áreas tratadas o con césped que ha sido cortado y tratado con este producto. No aplicar cuando el pasto esté estresado. No aplicar en horas de calor intenso. No aplicar cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/h. No aplicar en presencia de lluvias. No aplicar este producto por ningún sistema de riego.

