

"APLICACIÓN URBANA"



Insecticida-Acaricida Polvo Seco

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

Piretrinas (I y II): Piretrinas

0.20

(Equivalente a 2 g de i.a./kg)

INGREDIENTES INERTES:

Ajustador de pH y Vehículo

99.80

Total 100.00

No. de registro: RSCO-URB-INAC-0185-X0086-454-0.2

Puede ser nocivo en caso de ingestión
Puede ser nocivo por el contacto con la piel
Puede ser nocivo si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"

PRECAUCIÓN





"INSTRUCCIONES DE USO"

UDRED MAX es un insecticida-acaricida listo para usar. Se recomienda para su aplicación en: residencias, restaurantes, tiendas de autoservicio, escuelas, bodegas, casas móviles, construcciones nuevas, oficinas, departamentos, desvanes, asilo de ancianos, barcos, yates, autobuses, perreras, zoológicos, hoteles, hospitales, aviones, industria, plantas procesadoras de alimentos.

Para eliminar las siguientes plagas:

uso	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	OBSERVACIONES
Casas Cabañas Edificios Hoteles Restaurantes Plantas industriales Mercados Industria de los alimentos Hospitales Clínicas Centros de Salud Oficinas Almacenes Transportes Cines Teatros Escuelas Cuarteles	Cucaracha alemana Cucaracha americana Cucaracha Oriental	Blattella germanica Periplaneta americana Blatta orientalis	Aplique este producto en áreas donde las cucarachas se esconden o viven (debajo y atrás de aparatos electrodomésticos; en vacíos de plomería accesibles por medio de agujeros, alrededor de plomería y drenajes; en espacios vacíos debajo de gabinetes de cocina y baño. Muchos gabinetes tienen un espacio arriba de fácil acceso. Si no hay fácil acceso, taladre un agujero pequeño arriba del gabinete; en hendiduras alrededor de ventanas, puertas y gabinetes: debajo y atrás de calentadores de agua, lavadoras y secadoras. Asegúrese de aplicar en los vacíos de la plomería: en desvanes, alrededor del perímetro de tubería de respiraderos, arriba de cocinas y baños, alrededor de perímetros de cielos rasos, en los huecos de los ascensores, conductos de basura; debajo y atrás de cajas en las bodegas.
	Hormiga argentina Hormiga carpintera Hormiga de fuego Hormiga faraón Hormiga doméstica apestosa Hormiga del pavimento Hormiga grande amarilla Hormiga cortadora de hojas	Iridomyrmex hurmilis Camponotus spp. Solenopsis spp. Monomorium pharaonis Tapinoma sessile Tetramorium caespitum Acanthomyops interjectus Atta spp.	Indique el punto de infestación. Usando un espolvoreador, inyecte el polvo de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades.
	Pescadito de plata	Leosima sacchahna	Aplique en cantidades pequeñas directamente a las hendiduras y aberturas usando un espolvoreador u otro instrumento adecuado para aplicar el insecticida directamente. Los pescaditos se encuentran en áreas asociadas con el calor, como en los



			espacios donde hay calentadores o humedad,
	Termita de	Cryptotermes brevis	como cerca de los tubos de agua. En infestaciones localizadas, aplique a puntos
	madera seca	Incisitermes	directos. Trate de localizar los túneles.
		marginipennis	Taladre la madera infestada con hoyos de 1/4 de pulgada de diámetro en intervalos de 30.5
	Termita subterránea	Coptotermes crassus Heterotermes aureus Convexinotatus Reticulitermes flavipes Reticulitermes hesperus	cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades usando fuelles o espolvorea dores. En paredes de bloques con espacio, taladre hoyos de 1/4 de pulgada en la pared en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en las cavidades usando muelles o espolvoreadores.
	Alacránes	Centuroides spp	En áreas de interiores como rendijas en piezas de madera, closets, alrededor de la plomería, en las vías de acceso, puertas o ventanas y en otras áreas donde los alacranes pudieran esconderse, deberán tratarse con cuidado.
	Arañas	Latrodectus spp. Loxosceles spp.	Muchas arañas se encuentran asociadas con la humedad y por lo tanto, se encuentran en sótanos, en espacios donde se pueden arrastrar los insectos y en otras partes húmedas de las construcciones. Otras viven en los lugares secos, cálidos, por lo que se encuentran en las ventilas del aire de los subpisos, en esquinas superiores de las habitaciones o en los áticos. Casi todas las
			especies se esconcen en las hendiduras, en áreas oscuras o en otros lugares donde puedan construir la seda.
	Anóbidos	Calymmaderus oblongus Ernobius punctulatus	En infestaciones localizadas, aplique a punto directos. Trate de localizar los túneles. Taladre madera infestada con hoyos de ¼ de pulgada de diámetro en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades usando fuelles o espolvoreadores.
	Bostríquidos	Xylobiops basilaris	En infestaciones localizadas, aplique a puntos directos. Trate de localizar los túneles. Taladre la madera infestada con hoyos de ¼ de pulgada de diámetro en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades usando fuelles o espolvoreadores.
	Escarabajos de la madera	Lyctus planicollis	En infestaciones localizadas, aplique a puntos directos. Trate de localizar los túneles. Taladre la madera infestada con hoyos de ¼ de pulgada de diámetro en intervalos de 30.5 cm. Inyecte el producto de 3 a 5 segundos en los túneles y cavidades usando fuelles o espolvoreadores.



LUGARES DE APLICACIÓN Y DOSIS

Aplicación al suelo de manera directa al voleo de forma manual o mecanizada, con una distribución uniforme del producto sobre la superficie a tratar y directamente sobre el follaje procurando un cubrimiento completo, pero sin que se acumule demasiado polvo.

No aplicar directamente a fuentes de agua, a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen.

Aplicación en residencias:

El producto solo se debe de aplicar en áreas inaccesibles para las personas y animales domésticos. No usar en áreas comestibles. Cualquier polvo visible después de la aplicación debe ser removido hacia las áreas de aplicación como hendiduras o grietas.

Dosis: 454 g por 93 m² de espacio.

Aplicación en establecimientos donde se manejan alimentos

Las aplicaciones de este producto en las áreas de establecimiento donde se manejan alimentos no son permitidas, excepto en grietas, hendiduras y aberturas. Se debe tener cuidado para evitar que el producto sea esparcido por el aire. Evite la contaminación de alimentos y superficies donde se procesan éstos.

Dosis: 454 g por 93 m² de espacio.

Aplicación en áreas donde nos hay alimentos

Se incluyen cuartos para basura, lavamanos, drenajes, en el piso, entradas, vestíbulos, vestuarios, talleres mecánicos, cuartos de caldera garajes, armarios de limpieza y alimentos. Aplicar en los sótanos, alrededor de las tuberías, en áreas detrás y debajo de lavabos, mesas, armarios, y otras áreas donde los insectos se puedan esconder.

Dosis: 454 gr en 93 m² de espacio

Aplicación alcantarilla

Utilizar fuelles portátiles o un tanque a base de presión de aire.

Dosis: 3.632 kg por cada 279 m²

Aplicación en construcciones nuevas

Dosis: 1.816 kg por cada 93 m²

Aplicar en los vacíos de las plomerías y paredes. En desvanes aplicar el polvo alrededor del perímetro de estos y alrededor de respiraderos.

Tiempo de reentradas a las zonas tratadas: Esperar por lo menos una hora después de la aplicación. Se recomienda ventilar el lugar por 30 minutos y después ingresar.

Frecuencia de aplicación: La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la reincidencia de la plaga, por lo que se deberán de realizar inspecciones quincenales.

Intervalo entre aplicaciones: Estará determinado por la infestación del lugar tratado.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO, para abrir el saco, quitar la costura en la parte superior del saco con ayuda de un utensilio punzocortante (navaja o tijeras), realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar derrames y formación de nubes de polvo.

Aplicación al suelo de manera directa al voleo de forma manual o mecanizada, con una distribución uniforme del producto sobre la superficie a tratar y directamente sobre el follaje procurando un cubrimiento completo, pero sin que se acumule demasiado polvo sobre las plantas.

Para mejores resultados aplicar los productos por la noche o a temprana hora del día.

No aplicar directamente a fuentes de agua, a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen.



Durante el uso y manejo de **UDRED MAX** siempre utilice su equipo de protección personal. **UDRED MAX** es un producto que viene listo para ser utilizado. Para su aplicación se recomienda utilizar espolvoreadores o fuelles. Deposite el envase vacío en un Centro de Acopio.

Previo a la aplicación del producto, se recomiendan las siguientes acciones:

- Realizar una inspección para identificar los lugares, la presencia e intensidad de la infestación de las plagas.
- Sacar cualquier animal doméstico del área a tratar.
- Guardar y cubrir con bolsas cualquier alimento de consumo directo

Durante la aplicación:

- Utilizar equipo de protección personal.
- Nunca aplicar en presencia de personas que carecen del equipo de protección personal, o mascotas.
- Dirigir la aplicación en grietas, interior de las coladeras, fregaderos y hendiduras.
- Realizar una aplicación de tipo perimetral, formando una banda de protección.
- No contaminar depósitos de agua en interiores y exteriores.

CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en presencia de viento o las horas más calientes del día.

No asperjar el producto en áreas sucias o cubiertas por polvos y/o grasas, ya que pueden afectar la efectividad del producto.

No aplicar en áreas húmedas.

No debe de ser aplicado en mezcla con ningún otro producto.



