

"USO EXCLUSIVO DE JARDINERÍA"

# **PEILOR MAX**

## piretrinas (I y II)

**Polvo seco**

**Insecticida/Acaricida**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
Piretrinas (I y II): Piretrinas (Equivalente a 2 g de i.a./kg)	0.20
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Ajustador de pH y Vehículo	99.80
Total:	100.00

No. de registro: RSCO-INAC-0185-X0753-454-0.2

Puede ser nocivo en caso de ingestión  
Puede ser nocivo por el contacto con la piel  
Puede ser nocivo si se inhala



"HECHO EN MÉXICO"



**PRECAUCIÓN**



## "INSTRUCCIONES DE USO"

### "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

**PEILOR MAX** es un insecticida-acaricida listo para usar, no tiene olor, de uso en jardinería, para eliminar las siguientes plagas:

Plaga	Nombre científico	Dosis
Araña roja	<i>Tetranychus urticae</i>	5 g/m <sup>2</sup>
Araña café	<i>Loxosceles laeta</i>	
Chicharrita	<i>Empoasca spp</i>	
Pulgón	<i>Aphidiidae</i>	
Trips	<i>Thysanoptera</i>	
Falso medidor	<i>Trichoplusia ni</i>	
Gusano soldado	<i>Spodoptera exigua</i>	
Gusano peludo	<i>Utetheisa ornatrix</i>	
Grillos	<i>Grylloidea</i>	
Chapulín	<i>Sphenarium purpurascens</i>	
Cucarachas	<i>Blattodea</i>	10-20 g/m <sup>2</sup>
Pulgas	<i>Siphonaptera</i>	
Garrapatas	<i>Ixodoidea</i>	
Alacranes	<i>Scorpiones</i>	
Escarabajos	<i>Coleoptera</i>	5-10 g/m <sup>2</sup>
Ciempíes	<i>Chilopoda</i>	

**Frecuencia de aplicación:** La frecuencia de aplicación va a estar determinada por la infestación del lugar tratado.

**Intervalos entre cada aplicación:** Estará determinando por la infestación del lugar tratado.

**Tiempo de reentrada a zonas tratadas:** Esperar por lo menos una hora después de la aplicación.

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APlicAR EL PRODUCTO

Al preparar y aplicar el producto, se deberá usar la ropa y equipo de seguridad indicados en el apartado de PRECAUCIONES Y ADEVERTENCIAS DE USO en el lado izquierdo de la etiqueta. Aplicación al suelo de manera directa al voleo de forma manual o mecanizada, con una distribución uniforme del producto sobre la superficie a tratar y directamente sobre el follaje procurando un cubrimiento completo, pero sin que se acumule demasiado polvo sobre las plantas.

Para mejores resultados aplicar los productos por la noche o a temprana hora del día.

No aplicar directamente a fuentes de agua, a los productos alimenticios ni tampoco a las superficies en las cuales los alimentos se almacenan, preparan o comen.

### CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en presencia de viento o las horas más calientes del día.

